

NOWOŚĆ!

Ordynacja leków bezpieczna dla Ciebie i Pacjenta

Kompleksowa baza wiedzy o lekach w systemie SERUM

Od teraz możesz korzystać z profesjonalnej i kompletnej bazy wiedzy o lekach PHARMINDEX, która ułatwi Ci podejmowanie decyzji terapeutycznych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Korzystaj z wiedzy o lekach PHARMINDEX, kiedy chcesz:

- ✓ zweryfikować wymaganą przez Centrum e-Zdrowia (CeZ) jednostkę dawkowania danego produktu dla recept 365

W zakładce „Sugerowana jednostka dawkowania dla recept 365 (CeZ)” profesjonalista medyczny znajdzie jednostkę dawkowania dla tzw. recepty rocznej, której wymaga CeZ do wystawiania takiej recepty.

- ✓ szybko sprawdzić dawkowanie danego produktu leczniczego

PHARMINDEX zawiera szczegółowe informacje odnośnie dawkowania leku (w tym u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, w podeszłym wieku, u dzieci), jak również informacje o sposobie zażywania leku (np. z posiłkiem, bez posiłku, o danej porze dnia).

- ✓ mieć pewność, że właściwie dobierasz refundację

PHARMINDEX ułatwia dobór leku refundowanego zgodnie z rozpoznaniem jednostki chorobowej pacjenta, tym samym minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wypisywaniu recepty i gwarantuje bezpieczne rozliczenia z NFZ.


- ✓ upewnić się czy Twój pacjent może bezpiecznie przyjąć lek, który chcesz zaordynować

PHARMINDEX to także alerty bezpieczeństwa, czyli profil bezpieczeństwa leku przedstawiony w czytelnej, graficznej postaci. Dzięki czemu jesteś w stanie szybko ocenić, czy dany lek wpływa np. na sprawność psychomotoryczną Twojego pacjenta, czy jest bezpieczny dla kobiet w ciąży, karmiących piersią lub osób w podeszłym wieku

Wyszukiwanie informacji o leku to teraz zaledwie jedno kliknięcie! Jak to działa?

Jeśli używasz TurboBLOZ i masz wykupione prawo do korzystania z Serwisu BLOZ – Odpłatności wystarczy, że klikniesz żółty przycisk PHX w kolumnie “bezpieczeństwo” (rys.1). Jeśli nie spełniasz ww. warunków przycisk ten jest w kolorze szarym PHX (po najechnaniu na niego, otrzymasz informację o brakującym warunku do spełnienia i możliwości korzystania z funkcjonalności).

Jeśli chcesz móc korzystać z bazy wiedzy PHARMINDEX skontaktuj się ze swoim Opiekunem IT lub napisz do nas: medycyna@kamssoft.pl.



Nazwa (postać, dawka, opakowanie)	Dostępność	Odpłatności	Bezpieczeństwo
...	B 30% - 4,42	100% - 6,25	PHX
...	B 30% - 5,14	100% - 7,54	PHX
...	B 30% - 7,40	100% - 11,07	PHX
...	B 30% - 9,56	100% - 14,29	PHX
...	B 30% - 14,40	100% - 21,74	PHX
...	B 30% - 17,29	100% - 26,55	PHX
...	B 30% - 2,91	100% - 5,06	PHX
...	B 30% - 5,00	100% - 9,23	PHX
...	B 100%		PHX
...	B 100%		PHX

Rys. 1 Widok okna wybierania leków

2. Baza wiedzy o lekach PHARMINDEX zawiera szczegółowe informacje o produkcie leczniczym takie jak:
 1. Pełna informacja o leku Pharmindex, w tym precyzyjnie opisane wskazania refundowane
 2. Ulotka przylekowa - szybki i łatwy dostęp do ulotki wybranego leku, napisanej językiem zrozumiałym dla pacjenta
 3. Alerty bezpieczeństwa - profil bezpieczeństwa leku przedstawiony w czytelnej, graficznej postaci.
 4. Uprawnienia dodatkowe, które zapewnią Ci bezpieczeństwo w zakresie rozliczeń z NFZ.

Pharmindex - opis produktu

Pharmindex

Simvastatin
tabl. powł. | 20 mg | 28 szt.
Produkt leczniczy

Opis Pharmindex

Wskazania refundowane

Wskazania

Dawkowanie

Skład

Działanie

Przeciwwskazania

Środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią

Działania niepożądane

Interakcje

Uwagi

Sugerowana jednostka dawkowania dla recept 365 (CeZ)

Ulotka przylekowa

1. Co to jest lek [nazwa] i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku
3. Jak stosować lek
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek
6. Zawartość opakowania i inne informacje

Wskazania refundowane

Zakres wskazań objętych refundacją

- We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, kiedy reakcja na dietę lub inne nefarmakologiczne metody leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej jako uzupełnienie diety i innego leczenia obniżającego stężenie lipidów (np. aferza LDL) lub jeśli takie leczenie jest niewłaściwe lub niedostępne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń serca lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją

- Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepieniu narządów

Wskazania

Hipercholesterolemia. Leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, jako uzupełnienie diety, kiedy reakcja na dietę lub inne nefarmakologiczne metody leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca. Leczenie homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej w połączeniu z dietą i innymi metodami leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. aferza LDL), lub gdy inne metody leczenia są niewłaściwe lub niedostępne. Zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zmniejszenie zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z jawną miażdżycą naczyń mięśnia sercowego lub cukrzycą, z prawidłowym lub podwyższonym stężeniem cholesterolu, jako leczenie wspomagające, mające na celu skorygowanie innych czynników ryzyka lub uzupełnienie innej terapii zapobiegającej chorobom serca.

Dawkowanie

Doustnie. Zakres dawkowania to 5-80 mg podawane raz na dobę wieczorem. Jeśli jest to konieczne, dawkę należy korygować w odstępach co najmniej 4 tyg. do maksymalnie 80 mg podawanych raz na dobę, wieczorem. Dawka 80 mg na dobę jest zalecana tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, którzy nie osiągnęli celów leczenia za pomocą niższej dawki oraz kiedy spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Hipercholesterolemia

PHARMINDEX 0.3.0 Regulamin

Rys. 2 Baza wiedzy o lekach PHARMINDEX

Warto wiedzieć, że....



ALERT: SAMOCHÓD

7115 Leków ma wpływ na sprawność psychomotoryczną i czas reakcji. Poinformuj Pacjentów by zachowali ostrożność.



ALERT: WĄTROBA

7332 leków ma opisane w ChPL przeciwwskazania lub istotne ograniczenia do stosowani u pacjentów z współistniejącymi zaburzeniami funkcjonowania wątroby. Zweryfikuj, czy pacjent z chorobą wątroby ma dobrze dobraną dawkę leku.



ALERT: CIĄŻA

8289 leków posiada ograniczenia stosowania dla różnych trymestrów ciąży. Zaordynuj kobiecie ciężarnej bezpieczny lek.

**ALERT: KARMIENIE**

8996 leków posiada ograniczenia w ich stosowaniu związane z okresem laktacji. Zaordynuj kobiecie karmiącej piersią bezpieczny lek.

**ALERT: ALKOHOL**

3363 leków wchodzi w interakcje z alkoholem w różnym stopniu. Poinformuj Pacjentów by zachowali ostrożność.

**ALERT: NERKI**

7046 leków wymaga zmiany dawkowania zależnego od GFR lub CCr. Zweryfikuj, czy pacjent z chorobami nerek ma dobrze dobraną dawkę leku

**ALERT: MÓZG**

450 leków zawiera w swoim składzie substancje psychotropowe lub odurzające. Zachowaj ostrożność wystawiając receptę na te leki, poinformuj pacjentów o wpływie takich leków na OUN

**ALERT: BADANIA DIAGNOSTYCZNE**

2115 leków, poprzez swoisty wpływ na metodę oznaczania, zaburza wyniki testów diagnostycznych różnych typów dla różnych schorzeń i stosowanych substancji. Zachowaj ostrożność interpretując wynik badania.

**ALERT: WIEK W REFUNDACJI**

Dla ponad 2000 leków istnieją ograniczenia wiekowe w kwestii refundacyjnej. Płatnik może określić może zarówno dolną granicę wiekową dla refundacji danego produktu, jak i górną. Weryfikuj wiek pacjenta i wskazania refundowane wystawiając receptę na takie leki.

**ALERT: GERIATRIA**

Dla 6822 leków leków może być konieczne zachowanie ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku. Bezpieczeństwo stosowania leku w populacji geriatrycznej możesz sprawdzić korzystając z klasyfikacja FORTA

Korzystaj z PHARMINDEX za każdym razem, kiedy ordynujesz lek. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i Twojemu pacjentowi.

PHARMINDEX dostępny jest bez dodatkowych opłat dla użytkowników systemu medycznego SERUM, którzy używają TurboBLOZ i mają wykupione prawo do korzystania z Serwisu BLOZ – Odpłatności.

Masz pytania? Skontaktuj się ze swoim Opiekunem IT lub napisz pod adres: medycyna@kamssoft.pl.

